

## SERVIZIO DENTARIO SCOLASTICO CANTONALE (SDS 2018-2022) - Circondari nr. 43-45

Cr.nr.39: scuole elementari di Comano Nucleo, Comano Tavesio, Cureglia, Porza Tavesio, Porza Trida

Cr.nr.45: scuole elementari di Origlio, Ponte Capriasca e scuola R.Steiner

### INFORTUNI AI DENTI

aggiornato al 19 settembre 2022

#### Informazioni generali

In tutta Europa ca. il 50% di tutti i bambini e adolescenti (3 bambini e 2 ragazzi su 10) subiscono un infortunio ai denti prima dei 18 anni, non è dunque un problema che va sottovalutato, concerne da vicino ogni nucleo familiare.

Se non si interviene con la tempistica giusta ed una procedura corretta e rigorosa le conseguenze possono essere la perdita dei denti danneggiati, con complicazioni che si trascineranno inevitabilmente per tutta la vita, con interventi ricostruttivi complicati, invasivi e molto costosi, oltre ad implicazioni estetiche.

Tempistica e procedure corrette sono dunque fondamentali per una prognosi positiva, e una conseguente adeguata informazione è pertanto molto importante, coinvolgendo soprattutto famiglie e scuole (l'80% degli infortuni avviene entro 100m da casa o istituti scolastici), oltre che i centri sportivi, ricreativi, di aggregazione ecc.

All'Università di Basilea è stato fondato un centro specializzato negli infortuni ai denti di assoluta eccellenza a livello mondiale (Zahnunfall-Zentrum), che si è impegnato molto nell'informazione, soprattutto nelle scuole, dotandole anche di un apposito box salva-denti (dentosafe, si veda di seguito) fondamentale e spesso decisivo. I risultati sono logicamente molto incoraggianti, con percentuali di complicazioni tra le più basse al mondo. In quest'ottica l'ordine dei medici dentisti sta muovendo i dovuti passi per ottenere i medesimi risultati anche in Ticino.

Il ns studio aveva fornito già nel 2015 (una prima a livello cantonale, e non solo) alle scuole dei circondari di ns competenza un contenitore "dentosafe", consigliando (lettera sugli infortuni) di conservarlo in un posto accessibile e conosciuto da tutti gli addetti e di controllare la data di scadenza per la sostituzione; i costi sono piuttosto limitati (la prima confezione è stata offerta dal mio studio), ed è senz'altro possibile, anzi consigliato, acquistare una confezione privatamente in farmacia, soprattutto se si considerano gli enormi vantaggi in caso di effettivo bisogno.

#### DENTOSAVE (BOX SALVA-DENTI)

Si tratta di un piccolo contenitore nel quale riporre il dente perso (avulso), con un liquido che riproduce al meglio le condizioni naturali, per proteggere e conservare (vive) le cellule del parodonto (che assicurano l'ancoramento all'osso) e della polpa (vasi e nervo), fino a 48h dall'infortunio, mentre per altri metodi tradizionali di fortuna (latte freddo; foglio trasparente; ovatta umida ecc.) l'efficacia si riduce drasticamente fino a 2h. Il dente va comunque reimpiantato al più presto(!), la tempistica determina la prognosi. Restiamo a completa disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento supplementare.

#### INFORTUNI AI DENTI, CASI EFFETTIVI (tempistica e procedure corrette sono fondamentali)

-denti definitivi: recarsi dal dentista al più presto

-denti decidui (di latte): recarsi dal dentista appena possibile

-ogni infortunio (dente permanente/deciduo) va annunciato all'assicurazione

-contattare il pediatra entro 48h per eventuale profilassi del tetano

(in caso di forti mal di testa, disorientamento o nausea: escludere trauma cranico!)

#### PERDITA TOTALE DEL DENTE (AVULSIONE)

**Dente permanente** (può essere reimpiantato, idealmente entro 2 ore):

-non toccare con le mani la radice, recuperare il dente tenendolo per la corona

-non pulire o disinfettare, non asciugare o conservarlo asciutto.

-riporre il dente nel "box dentosafe", event. nel latte freddo, pellicola trasparente, ovatta umida...

-recarsi dal dentista in ogni caso al più presto(!), è infatti decisivo per una buona prognosi.

-annunciare l'incidente alla cassa malati (infortuni) o all'assicurazione complementare (infortuni)

-contattare il pediatra entro 48h per eventuale profilassi del tetano

**Dente di latte (deciduo): non può essere reimpiantato; recarsi però dal dentista e annunciare all'ass.**

## FRATTURA CON/SENZA SPOSTAMENTO (DISLOCAZIONE)

### Dente permanente:

- recuperare il frammento, se possibile, e conservarlo in acqua
- recarsi dal dentista al più presto (riposizionamento/otturazione; eventuale medicazione/cura radice; splint)
- annunciare l'incidente alla cassa malati (infortuni) o all'assicurazione complementare (infortuni)

**Dente deciduo (di latte): recarsi dal dentista appena possibile; annunciare all'assicurazione**

## SPOSTAMENTO (DISLOCAZIONE) SENZA FRATTURE VISIBILI

### Dente permanente:

- recarsi dal dentista al più presto (eventuale frattura radicolare: riposizionamento-splint)
- annunciare l'incidente alla cassa malati (infortuni) o all'assicurazione complementare (infortuni)

**Dente deciduo (di latte): recarsi dal dentista appena possibile; annunciare all'assicurazione**

## SCALFITURE O FRATTURE DI LIEVE ENTITÀ

### Dente permanente:

- recarsi dal dentista al più presto (eventuali fratture radicolari o dislocazioni non valutabili)
- annunciare l'incidente alla cassa malati (infortuni) o all'assicurazione complementare (infortuni)

**Dente deciduo (di latte): recarsi dal dentista appena possibile; annunciare all'assicurazione**

## COLPO (CONTUSIONE) SENZA FRATTURE VISIBILI, CON/SENZA DISLOCAZIONI

### Dente permanente:

- recarsi dal dentista al più presto (eventuali fratture radicolari o dislocazioni non valutabili)
- annunciare l'incidente alla cassa malati (infortuni) o all'assicurazione complementare (infortuni)

**Dente deciduo (di latte): recarsi dal dentista appena possibile; annunciare all'assicurazione**

Restiamo a completa disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento supplementare, anche per casi effettivi.

y.campana

Cureglia-Comano-Porza/Ponte Capriasca-Origlio

